



PRODOTTI AUTORIZZATI DAL *Ministero della Salute* PER MOTIVI ECCEZIONALI SU PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME

PRODOTTO, SOSTANZA ATTIVA e DATA DEL DECRETO	DITTA	CLASSE TOSSICO LOGICA	CAMPI D'IMPIEGO	MODALITA' D'IMPIEGO	QUANTITA' DA SCIogliere IN ACQUA	FRASI DI PRUDENZA
DANTOP 50 WG Clothianidin 26 giugno 2009	<i>SUMITOMO</i> <i>CHEMICAL</i> <i>AGRO</i> <i>EUROPE SAS</i>	Nocivo	Palme in campo e vivaio	Localizzato alle foglie/ corona	15-20 g/hl	Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura; Segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso alle aree trattate, mantenendo tale divieto per 48 ore dopo l'applicazione del prodotto
				Endoterapia	10 gr/litro (il volume della soluzione varia in funzione della dimensione della pianta e della tecnologia endoterapica)	
			Palme in vivaio	Localizzato al terreno	30 g/50 mq (in 50 litri)	
KOHINOR PLUS PAL Imidacloprid Ciflutrin 26 giugno 2009	<i>MAGAN</i> <i>ITALIA</i>	Non classificato	Palme in campo, aree urbane e vivai	Localizzazione fogliare/ corona e endoterapia	120 ml/hl	Non rientrare nelle zone trattate prima che la superficie fogliare sia completamente asciutta. Per eventuali operazioni da effettuarsi entro 24 ore dal trattamento, utilizzare dispositivi di protezione personale al fine di evitare il contatto cutaneo.
				Impianti di irrigazione a goccia o direttamente al suolo dopo la crisi di trapianto	1600 ml/ hl (due applicazioni a distanza settimanale)	
				Localizzata tramite iniezioni al tronco	10-20 ml per ogni metro di circonferenza del tronco, alla concentrazione dello 0,5% (5 ml /litro)	

NEEMAZAL-T/S Azadiractina A 07 luglio 2009	<i>INTRACHEM</i> <i>BIO ITALIA SPA</i>	Non classificato	Palme in campo, aree urbane e vivai	Applicazione fogliare/ corona, al terreno in vivaio e in endoterapia	50-300 ml/pianta (secondo le dimensioni della palma e del livello di infestazione)	In caso di impiego del prodotto in aree pubbliche segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso alle aree trattate, mantenendo tale divieto per 24 ore dopo l'applicazione del prodotto
PIRINEX PAL (micro incapsulato) Clorpirifos + deltametrina 26 giugno 2009	<i>MAKHTESHIM</i> <i>ITALIA</i> <i>SRL</i>	Non classificato	Palme in campo, aree urbane e vivai	Localizzazione fogliare/ corona	150 ml/hl	Non rientrare nelle zone trattate prima che la superficie fogliare sia completamente asciutta. Per eventuali operazioni da effettuarsi entro 24 ore dal trattamento, utilizzare dispositivi di protezione personale al fine di evitare il contatto cutaneo.
RELDAN 22 Clorpirifos metil 26 giugno 2009	<i>DOW</i> <i>AGRO SCIENCE</i> <i>ITALIA SRL.</i>	Irritante	Palme nel verde urbano, in vivaio e pieno campo	Alla chioma a bassa pressione, in presenza del parassita; nei luoghi pubblici preferibilmente nelle ore notturne	500 ml/ hl	In caso di impiego del prodotto in aree pubbliche segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso alle aree trattate, mantenendo tale divieto per 24 ore dopo l'applicazione del prodotto.
VERTIMEC E Abamectina 26 giugno 2009	<i>SYNGENTA</i> <i>CROP</i> <i>PROTECTION</i> <i>SPA</i>	Nocivo	Palme ornamentali in campo, vivai e aree urbane	Iniezioni al tronco	25-50 ml per litro	Transennare l'area onde impedire l'accesso a personale estraneo
ZELIG GR PALME Clorpirifos 7 luglio 2009	<i>MAKHTESHIM</i> <i>ITALIA</i> <i>SRL</i>	Non classificato	Palme e vivai di palme	Localizzazione fogliare/ corona	10-15 kg/ha	Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura

PER LA CORRETTA APPLICAZIONE DEL PRODOTTO, NON POTENDOSI ESCLUDERE ERRORI O OMISSIONI, PRIMA DELL' USO FARE SEMPRE RIFERIMENTO ALL'ETICHETTA

NOTE:

- per tutti i prodotti la scadenza è fissata a 120 gg dalla data dei rispettivi decreti riportata nella prima colonna della tabella
- i prodotti classificati (nocivi) possono essere utilizzati nelle aree urbane (se riportato in etichetta) soltanto in endoterapia
- per palme site in aree verdi quali parchi, viali e giardini pubblici trattare preferibilmente nelle ore notturne e in assenza di vento; irrorare a bassissima pressione veicolando il prodotto fitosanitario esclusivamente all'interno della corona fogliare possibilmente utilizzando impianti fissi al tronco con aspersione a doccia
- con nota del 15.07.08 il Ministero della Salute ha stabilito che le palme all'interno di giardini privati vanno considerate allo stesso modo di quelle presenti in aree urbane pubbliche e dovranno essere adottate le stesse norme precauzionali descritte nelle frasi di prudenza

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE L'UFFICIO IN INTESAZIONE