

SCHEMA DI CENSIMENTO DEL BOSCO VETUSTO "Faggeta di Grappidà"

0) GENERALE

Data inizio censimento	29/08/2024	
Codice		
Nome bosco	Faggeta di Grappidà	
Note aggiuntive		
UNESCO	SI	<u>NO</u>
Potenzialmente vetusto	SI	<u>NO</u>

1) REFERENTI DELLA SCHEDA

Cognome referente regionale	Girgenti
Nome referente regionale	Paolo
Ente di appartenenza	Comando Corpo Forestale Regione Siciliana

Gruppo di lavoro

Nominativo	Contatti (e-mail)	Materia di competenza
Donato Salvatore La Mela Veca	donato.lamelaveca@unipa.it	Selvicoltura
Emilio Badalamenti	emilio.badalamenti@unipa.it	Selvicoltura
Giovanni Oliveri	giovanni.oliveri01@unipa.it	Selvicoltura
Tommaso La Mantia	tommaso.lamantia@unipa.it	Ecologia
Rafael da Silveira Bueno	rafael.dasilveirabueno@unipa.it	Ecologia
Leonardo Scuderi	scuderileo@yahoo.it	Botanica
Paolo Contrino	p.contrino@geoconsulting.it	Gis
Salvatore Pasta	salvatore.pasta@cnr.it	Botanica

Referente scheda di censimento Donato Salvatore La Mela Veca

Contatti referente scheda di censimento donato.lamelaveca@unipa.it

1.1) Svolge la seguente valutazione sulla base di

Iniziativa regionale	SI	NO
Segnalazione da parte di		
In data	29/08/2024	

2) LOCALIZZAZIONE DEL POPOLAMENTO proposto come bosco vetusto

Regione	Sicilia			
Località	Grappidà			
Provincia/e	CT			
Comune/i	Bronte			
Coordinate geografiche del punto di accesso su sentiero o pista Sistema di riferimento WGS84 (cod. EPSG 4326)	E	14° 46' 49.959"	N	37° 55' 56.186"

Dati catastali

Comune	Sezione	Foglio	Particella
Bronte		1	1
Bronte		1	2
Bronte		2	9

Riferimenti Carta Tecnica Regionale	CTR 612060
Riferimenti Ecoregione (1)	2B3b Sicilia Mountains subsection
Sito Natura 2000	ZPS "Monti Nebrodi" (ITA030043)
Area Protetta L. 394/91	
Area Protetta L.R. n. 98 del 1981 e s.m.i. L.R. n. 14 del 1988	Parco Regionale dei Nebrodi

(1) Blasi, C., Capotorti, G., Copiz, R., Guida, D., Mollo, B., Smiraglia, D., & Zavattero, L. 2014. Classification and mapping of the ecoregions of Italy. *Plant Biosystems*, 148 (6): 1255-1345.

Blasi, C., Capotorti, G., Copiz, R., & Mollo, B. 2018. A first revision of the Italian Ecoregion map. *Plant Biosystems*. 152 (6): 1201-1204.

3) ACCESSO

Dal punto di accesso su sentiero o pista	Dal Rifugio Arcarolo, proseguire per circa 300 metri in direzione ovest fino a raggiungere il cancello che delimita l'ingresso
---	--

3.1 Strada/pista	
limitazione all'accesso (scegli voce dall'elenco)	solamente mezzi autorizzati
percorribile con mezzi (scegli voce dall'elenco)	fuoristrada
lunghezza (km)	15 Km da Randazzo
tempo di percorrenza (h)	1 h in auto da Randazzo

3.2 Sentiero/mulattiera	
limitazione all'accesso (scegli voce dall'elenco)	
lunghezza (km)	(breve descrizione testuale)
tempo di percorrenza (h)	(breve descrizione testuale)
difficoltà del sentiero (scegli voce dall'elenco)	

4) PROPRIETÀ

4.1	pubblica
Enti proprietari	
Ente proprietario	Referente
Comune di Bronte	

4.2	privata
Soggetti proprietari	
Nominativo/Ragione sociale	Rappresentante legale

5) SUPERFICIE

Ettari	10	Are	60	Centiare	41
--------	----	-----	----	----------	----

6) CONFINI

Descrizione dettagliata delle superfici che delimitano esternamente la superficie proposta come bosco vetusto	<i>Il bosco in esame è delimitato a Nord, Nord-est e Nord-ovest da boschi di faggio, stessa tipologia forestale che caratterizza il opopolamento vetusto, mentre a Sud, Sud-est e Sud-ovest lo stesso confina con popolamenti di cerro.</i>
--	---

7) DATI STAZIONALI

Quota (m s.l.m.)	max	1.500	min	1.300
Esposizione prevalente <small>(scegli voce dall'elenco)</small>	S/E			
note aggiuntive				
Pendenza media (%) <small>(scegli voce dall'elenco)</small>	20-40%			
note aggiuntive				
Litologia prevalente	<i>Il bosco insiste in aree con substrato caratterizzato dal flysch, si riscontra la presenza di rocce argillose-arenacee intervallate da argille scagliettate grigio-chiaro (Fonte: Piano di stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, 2004).</i>			
Geomorfologia	<i>Il bosco si estende sulla parte alta di un versante.</i>			
Idrografia	<i>Il bosco ricade nel bacino idrografico del Simeto e del Lago di Pergusa (Fonte: Piano di gestione del distretto idrogeografico della Sicilia).</i>			

8) NOTIZIE STORICHE SUL POPOLAMENTO

In assenza di notizie storiche desumibili da fonti bibliografiche sulla gestione pregressa del bosco in questione, si rimanda l'acquisizione delle notizie a una indagine specifica da realizzare nei prossimi anni.

9) COMPOSIZIONE DEL POPOLAMENTO FORESTALE – BIODIVERSITA'

(2) Rispetto alla scheda di censimento allegata al decreto di approvazione delle "Linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti e indicazioni per la loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della Rete nazionale dei boschi vetusti", gli attributi "Categoria forestale" (INFC) e "Tipo/tipi forestali" (Del Favero) sono qui quelli estrapolati secondo la corrispondenza univoca tra tipologie locali, European forest types (EEA), categorie sensu Del Favero e categorie INFC trovata nell'ambito del Progetto FROMPAAF (Report Raccolta analisi e armonizzazione delle cartografie forestali esistenti a scala regionale sul territorio italiano per la realizzazione della CFI2020, maggio 2023).

(3) Blasi C. (ed.), 2010. La Vegetazione d'Italia. Palombi & Partner S.r.l. Roma; Blasi C. (ed.), 2010. La Vegetazione d'Italia. Carta delle Serie di Vegetazione, scala 1: 500.000. Palombi & Partner S.r.l. Roma.

Riferimento sintassonomico (4)					
Classe	Ordine	Alleanza	Sub alleanza	Associazione	Sub associazione
QUERCO ROBORIS-FAGETEA SYLVATICAЕ	FAGETALIA SYLVATICAЕ	<i>Geranio versicoloris-Fagion sylvaticae</i>		<i>Anemono apenninae-Fagetum sylvaticae</i>	

(4) Biondi E., Blasi C., Allegrezza M., Anzellotti I., Azzella M. M., Carli E., Casavecchia S., Copiz R., Del Vico E., Facioni L., Galdenzi D., Gasparri R., Lasen C., Pesaresi S., Poldini L., Sburlino G., Taffetani F., Vagge I., Zitti S. & Zivkovic L. 2014. Plant communities of Italy: The Vegetation Prodrome, Plant Biosystems, 148 (4): 728-814

Specie arboree determinanti la fisionomia

Nome specie	Nome comune
<i>Fagus sylvatica</i>	Faggio

Ulteriori specie arboree

Nome specie	Nome comune
<i>Acer campestre</i>	Acero campestre
<i>Malus sylvestris</i>	Melo selvatico
<i>Quercus cerris</i>	Cerro

Specie degli strati arbustivo ed erbaceo	<i>Ilex aquifolium</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Daphne laureola</i> , <i>Euphorbia meuselii</i> , <i>Rubus gr. hirtus</i> , <i>Acinos alpinus</i> subsp. <i>meridionalis</i> , <i>Fragaria vesca</i> , <i>Viola alba</i> subsp. <i>dehnhardtii</i>
Flora di particolare valore conservazionistico	<i>Cyclamen hederifolium</i> subsp. <i>confusum</i>

Licheni e funghi legati alla mancanza di disturbo, alla presenza di stadi maturi e/o senescenti

Funghi (Presenza di specie indicative)	La mancanza di dati bibliografici e le esigue risorse disponibili non hanno permesso di realizzare un inventario specifico delle specie fungine. Si rimanda ad una fase successiva tale inventario, in funzione della disponibilità di fondi.
Licheni* (Presenza di specie indicative)	<i>Lobaria pulmonaria</i>

Muschi (Presenza di specie indicative)	<i>Frullania dilatata, Leucodon sciurooides, Leptodon smithii, Orthotrichum affine, Orthotrichum striatum</i> (Fonte: Marino, M. L., Campisi, P., & Cirlincione, F. (2025). Old-Growth Forests and Bryophyte Communities in Italy and the Broader Mediterranean Region: A Literature Review. <i>Plants</i> , 14(18), 2824)
--	--

* Sono state indicate solamente le specie riconosciute dall'esperto botanico. La mancanza/carenza di dati bibliografici e le esigue risorse disponibili non hanno permesso di realizzare un inventario specifico dei licheni. Si rimanda ad una fase successiva tale inventario, in funzione della disponibilità di fondi.

10) BIODIVERSITA' FAUNISTICA

10.1 Elementi faunistici ritenuti significativi		
a)	Presenza di fauna saproxilica (insetti) tipica dell'area geografica*	SI NO
	sporadica	
Diffusione	diffusa	
	abbondante	
Elenco specie		

*nessun dato bibliografico trovato

b)	Presenza di nidificatori di cavità	SI NO
	sporadica	
Diffusione	diffusa	
	abbondante	X
Elenco specie	<i>Asio otus, Jynx torquilla, Poecile palustris siccus, Periparus ater, Sitta europaea</i>	

c)	Presenza di avifauna indicatrice di buono stato di conservazione	SI NO
	sporadica	
Diffusione	diffusa	
	abbondante	X
Elenco specie	<i>Accipiter nisus, Aegithalos caudatus siccus, Asio otus, Jynx torquilla, Poecile palustris siccus, Periparus ater, Phylloscopus collybita, Sitta europaea</i>	

d)	Presenza di altra fauna vertebrata indicatrice di buono stato di conservazione N.B. Campo non presente nella Scheda di censimento.	SI NO
	sporadica	
Diffusione	diffusa	
	abbondante	X
Elenco specie	<i>Felis sylvestris, Martes martes, Glis glis, Muscardinus avellanarius</i>	

10.2 Qualità biologica del suolo, tramite indice QBS-artropodi (6)		
Valore indice QBSar		n° campioni

Le esigue risorse disponibili non hanno permesso di rilevare questo indicatore, si rimanda ad una fase successiva tale inventario in funzione della disponibilità di fondi.

(6) Indice di Qualità Biologica del Suolo– microartropodi (QBS-ar): non esistendo procedure standardizzate, i diversi Enti che utilizzano questo indicatore (ARPA, Università) hanno elaborato propri criteri per il campionamento partendo da “Background teorico e applicazione dell’indice di Qualità Biologica del Suolo (QBS - Parisi, 2003)”, e sulle indicazioni fornite con la “Guida Tecnica sui metodi biologici ed ecotossicologici” dettagliata negli Atti del Convegno Nazionale CTN TES di Torino del 13 maggio 2004;
 Parisi V., Menta C., Gardi C., Jacomini C., 2003. Evaluation of Soil Quality and Biodiversity in Italy: the Biological Quality of Soil Index (QBS) approach. OECD Expert Meeting on Soil Erosion and Soil Biodiversity Indicators, 25-28 March, 2003;

11) COMPONENTE ARBOREA: STADI SERIALI ED ELEMENTI STRUTTURALI

11.1	Diversificazione per dinamica successionale e per dimensioni della componente arborea			
a)	Stadio dinamico	Presenza	% indicativa stimata sul tot. dell'area	Diffusione (7)
I	Aree aperte	SI	15	diffusa
II	Cespuglieti e mantelli	NO		
III	Fustaia matura	SI	75	frequente
IV	Fustaia senescente	SI	10	sporadica
Totale percentuale (8)		100		
V	Rinnovazione	SI	10	sporadica
	Novelleto	SI	10	sporadica
	Spessina	NO		

(7) Selezionare dall’elenco. Livelli di diffusione: sporadica (1-10%), diffusa (11-30%) frequente (31-100%)

(8) Il totale deve essere uguale a 100

Note aggiuntive	(altre informazioni)
------------------------	----------------------

11.2	Presenza di alberi vivi di grandi dimensioni con diametro a petto d'uomo (D) >50 cm	SI	NO
Numero ad ettaro	75		
Note aggiuntive	<i>Fagus sylvatica</i>		

11.3	Presenza di legno in fase di senescenza/decomposizione		
a)	Alberi habitat vivi (D > 50 cm) con cavità costituenti habitat per la fauna (uccelli, insetti, ecc.)	SI	NO
Numero ad ettaro (D> 50 cm)	10		
Note aggiuntive	<i>Fagus sylvatica</i>		

b)	Alberi habitat morti in piedi (D > 50 cm)	SI	NO
----	---	-----------	-----------

Numero ad ettaro ($D > 50 \text{ cm}$)	(totale)
Note aggiuntive	(indicare fino a 10 specie di alberi habitat morti in piedi, qualora riconoscibili, in ordine di numerosità decrescente)

c) Legno morto a terra (di dimensione simile a quella degli alberi in piedi)	SI	NO
<i>sporadica</i>		
<i>Diffusione</i>	X	
<i>abbondante</i>		
<i>Legno morto a terra con diametro medio inferiore ai 50 cm.</i>		
Note aggiuntive		

11.4 Lettiera			
a) Presenza di lettiera profonda	SI	NO	
<i>Distribuzione</i>	<i>discontinua</i>	X	
	<i>continua</i>		
Descrizione			

11.5 Area basimetrica almeno una area di saggio per Tipo Strutturale presente			
Area basimetrica totale	<i>non rilevata</i>		
Area basimetrica degli alberi vivi con $D > 50 \text{ cm}$	<i>40,5 (metri quadrati a ettaro)</i>		
Note aggiuntive	<i>Poiché i boschi vetusti censiti sono risultati profondamente eterogenei dal punto di vista strutturale, per ragioni legate alla mancanza di risorse sufficienti sono state realizzate aree di saggio speditive di 0,5 ha di superficie per la stima della densità e dell'area basimetrica media degli alberi di grandi dimensioni ($D > 50 \text{ cm}$). I rilievi dendrometrici più dettagliati saranno realizzati quando saranno disponibili ulteriori risorse economiche.</i>		

12) ALTRE INFORMAZIONI UTILI

(inserire, ove disponibile, il volume per ettaro e ulteriori informazioni sul rilievo ritenute di interesse)

13) VALUTAZIONI DI SINTESI

SINTESI PREREQUISITI OBBLIGATORI (articolo 3, comma 2, lettera s bis del d.lgs. 34/2018)

A	Presenza di specie autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico	<u>SI</u>	NO
B	Biodiversità caratteristica conseguente all'assenza di disturbi da almeno 60 anni	<u>SI</u>	NO
C	Presenza di stadi seriali legati alla rinnovazione e alla senescenza	<u>SI</u>	NO

N.B. Nel caso in cui si tratti di un bosco che presenti due soli dei tre requisiti imprescindibili, al momento del censimento, la Regione può decidere di inserirlo in qualità di *Potenzialmente vetusto* in attesa che sia raggiunto anche il terzo requisito.

NOTE EVENTUALI	Si ringraziano Antonino Cairone, in servizio presso il Distaccamento forestale di Caronia (ME), e Agatino Sidoti, Sebastiano Lupica, Giuseppe Cantali, Santo Montagno e Filippo Trovato, in servizio presso il Servizio Territoriale di Catania del Dipartimento Sviluppo Rurale, per l'assistenza fornita nelle fasi di individuazione e delimitazione del bosco vetusto.
-----------------------	--

ALLEGATI (Max 20 allegati con dimensione di 20 MB)

Provvedimento amministrativo di riconoscimento BV
Planimetria catastale
Bibliografia di riferimento
Cartografie tematiche aggiuntive e utili
Documentazione fotografia (max 10 foto)
Piano di gestione
(altro)

Data 24/11/2025

**Firma leggibile
del referente della scheda**