



Sostanze attive autorizzate per l'impiego in agricoltura:

AVOCADO

Aggiornamento al 20 settembre 2024

Sostanza attiva	Tipologia	IdS	LMR	Uso	MoA
Acido pelargonico	diserbante	3		C	Z
Adalia bipunctata <i>bio</i>	ausiliare biologico	-		C	
Amblyseius andersoni <i>bio</i>	ausiliare biologico	-		C	
Amblyseius swirskii <i>bio</i>	ausiliare biologico	-		C	
Anagyrus vladimiri <i>bio</i>	ausiliare biologico	-		C	
Birra <i>bio</i> (1)	limacida	-		C	
Chitosano	elicitore	-		D	
Coniothyrium minitans <i>bio</i>	fungicida	-	-*	C	
Dazomet	dis/fun/insett/nemat		0,01*	T.a.c.	8F
Etilene <i>bio</i>	fitoregolatore	-		D	
Exochomus quadripustulatus <i>bio</i>	ausiliare biologico	-		C	
Fosfato di diammonio <i>bio</i>	attrattivo	-		C	
Fosfato ferrico <i>bio</i> (2)	limacida	-	-*	C	
Fosfonati di potassio	fungicida	15	70	C	P07
Fosfuro di zinco	rodenticida	-	0,01*	C	
Glifosate (2)	diserbante	-	0,1**	C	G
Hippodamia convergens <i>bio</i>	ausiliare biologico	-		C	
Macrocheles robustulus <i>bio</i>	ausiliare biologico	-		C	
Maltodestrina <i>bio</i>	acaricida/insetticida	-		C	
MCPA	diserbante/fitoregolatore	-	0,05**	C	O
Metam-potassio	diserbante/fungicida/insetticida/nemat.	-	0,01**	T.a.c.	8F
Metam-sodium	diserbante/fungicida/insetticida/nemat.	-	0,01**	T.a.c.	8F
Metil-isotiocianato (3)	diserbante/fungicida/insetticida/nemat.	-	0,01**	T.a.c.	
NAA (4)	fitoregolatore	7	0,06**	C	
Neodryinus typhlocybae <i>bio</i>	ausiliare biologico	-		C	
Neoseiulus californicus <i>bio</i>	ausiliare biologico	-		C	
Neoseiulus cucumeris <i>bio</i>	ausiliare biologico	-		C	
Nephus conjunctus <i>bio</i>	ausiliare biologico	-		C	
Olio di arancio <i>bio</i>	acaricida/fungicida/insetticida	3		C	
Olio minerale paraffinico <i>bio</i>	acaricida/insetticida	20	0,01*	C	NC
Paecilomyces lilacinus cp 251 <i>bio</i>	nematocida	-	-*	C	
Phytoseiulus persimilis <i>bio</i>	ausiliare biologico	-		C	
Sali di potassio degli acidi grassi <i>bio</i> (2)	acaricida/insetticida	0		C	
Steirneria carpocapsae <i>bio</i>	ausiliare biologico	-		C	
Talco E553B <i>bio</i>	barriera fisica contro insetti e funghi	-		C	
Trichoplia drosophilae <i>bio</i>	ausiliare biologico	-		C	
Zolfo	acaricida/fungicida	3	-*	C	M 2

LEGENDA

bio = uso consentito in agricoltura biologica

IdS = Intervallo di sicurezza

LMR = Limite Massimo di Residuo (Reg. CE 396/2005)

*= esente da indicazione

**= limite inferiore di rilevabilità analitica

(1) Impiego in pieno campo /all'aperto

(2) Applicazione anche in vivaio

(3) Sostanza risultante dall'impiego di dazomet o metam

(4) Utilizzo come spollonante

Dati tratti da: BDF banca dati fitofarmaci di BDF srl Milano www.bdfsr.it

NOTA: Riguardo la corretta modalità di impiego, variabile per ciascun prodotto fitosanitario e le specifiche utilizzazioni (es. divieto di impiego in serra, impiego solo al terreno, in post fioritura, ecc.) si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate nell'etichetta del formulato commerciale poichè solo così si ha la certezza di operare correttamente. La presente scheda ha esclusivamente finalità divulgative. Tenuto conto della continua evoluzione della legislazione sui prodotti fitosanitari non si escludono imprecisioni ed omissioni la cui segnalazione sarà gradita.