

Monitoraggi dei parassiti degli agrumi previsti da protocollo fitosanitario Italia – Brasile *
Monitoring pests of citrus fruits under the phytosanitary protocol Italy - Brasil *

FOR FREE PRODUCTION SITE-ISPM 10

PARASSITA/PEST: 2. *Cacoecimorpha pronubana* - NOME COMUNE/COMMON NAME: Carnation tortrix/Bega del garofano

Azienda di produzione/Farmer _____ codice agrumeto/ orchard code _____

Specie e var. coltivata/speciesvariety	Giorno/day	Catture medie trappole (n. individui/n.__trappole) Average catch traps (n. specimens/n.__traps)	Media di foglie/frutti con larve (n. foglie o frutti con larve/n___foglie o frutti) Average leaves or fruits with eggs (n. leaves fruits with eggs/ n.___fruits)	Note/notes

Metodo di monitoraggio/monitoring method

Controllare a cadenza quindicinale la presenza del parassita controllando le trappole a feromoni (nella misura di 1-2 ad ettaro - max 4 trappole per appezzamento omogeneo) e sezionando 20 frutti presi da 20 alberi ad ettaro

Check every two weeks the presence of the pest in the traps (pheromone traps, n.1-2 per hectare - maximum 4 traps homogeneous area) and on 20 fruits harvested on 20 trees per hectare

*La scheda di monitoraggio dovrà essere accompagnata da copia del “quaderno di campagna” - The monitoring schedule must be accompanied by a copy of "calendar treatment of the orchard"